

Số: 02 /HD-TTĐVNN

Nam Sách, ngày tháng 02 năm 2023

HƯỚNG DẪN

Kỹ thuật sử dụng thuốc trừ cỏ, ốc bươu vàng trên lúa

Để giúp nông dân trừ cỏ, ốc bươu vàng trên lúa đạt hiệu quả cao và an toàn trong vụ xuân năm 2023, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nam Sách khuyến cáo một số loại thuốc và kỹ thuật sử dụng, giúp nông dân sử dụng đúng kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao, an toàn.

I. Kỹ thuật sử dụng thuốc trừ cỏ lúa.

1. Đối với lúa gieo thẳng (gieo vãi).

Thuốc trừ cỏ cho lúa gieo thẳng ta nên chọn loại thuốc; So fit 300EC, MI CHEL LE 62EC, Me co 60EC; P re fit 324WP, New He co 600EC...; Thuốc có tác dụng trừ được nhiều loại cỏ trên ruộng lúa;

- Thời gian: Phun thuốc sau gieo từ: 2- 5 ngày.

- Liều lượng: Pha 35-50ml thuốc với 12-18 lít nước phun đều cho 1 sào(360m²).

2. Đối với lúa cấy mạ được và mạ sên (mạ non).

Thuốc trừ cỏ cho lúa cấy có nhiều loại, nhưng tập trung vào 2 nhóm chính đó là:

2.1 Thuốc trừ cỏ tiền và hậu nảy mầm:

Các loại thuốc tiền nảy mầm như; He co 60EC; Bu to xim 60EC; Py ra sus 10WP,...; Thuốc trừ được nhiều loại cỏ trên ruộng lúa;

- Thời gian: Phun thuốc sau cấy từ: 3-6 ngày;

- Liều lượng: Pha 40-45ml thuốc với 12-18 lít nước phun đều cho 1 sào(360m²);

Ngoài ra có thể sử dụng các loại thuốc tiền và hậu nảy mầm như: Fenrim 18.5WP, Pi so rim 18,5WP, Qui nix 32WP Thuốc có hiệu quả cao với các loại cỏ trên ruộng lúa, có thể pha với nước để phun hoặc trộn với đạm, đất bột, cát, tro bếp để rắc.

- Thời gian: Sau cấy từ: 7-10 ngày;

- Liều lượng: Theo hướng dẫn trên vỏ bao bì.

2.2 Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm ta nên chọn:

Có các loại như: An kill 40WP, PY AN CHOR GOLD 8.5EC, GIN GA 33WG. Thuốc có hiệu quả trừ cỏ đuôi phụng, họ hòa bản, cỏ lá rộng, cỏ lác, cỏ lồng vực, rau mác,....

- Thời gian: Phun sau khi gieo hoặc cấy từ: 10-15 ngày.

- Liều lượng: Theo hướng dẫn trên vỏ bao bì.

- Phương pháp phun thuốc: Trước khi phun thuốc phải tháo cạn nước (phun thuốc cần đất đủ ẩm); sau phun thuốc 1 ngày đưa nước vào ruộng, giữ mức nước từ: 2-3cm và giữ nước trong thời gian 5-7 ngày;

Chú ý: Các biện pháp canh tác như: Làm đất kỹ, san phẳng ruộng, trang luống, bón phân, ngâm ủ, gieo hạt, tháo nước, phun thuốc và điều tiết nước thực hiện đúng

theo yêu cầu kỹ thuật gieo cấy đảm bảo cho cây mạ sinh trưởng và phát triển tốt. Không được để nước quá lớn hoặc ngập đỉnh sinh trưởng. Khi rắc thuốc lá lúa phải khô. Khi phun hoặc rắc thuốc phải thực hiện đúng nội quy về an toàn, bảo hộ lao động; vệ sinh cá nhân sau sử dụng thuốc, tiêu hủy bao bì đúng nơi quy định./.

II. Kỹ thuật sử dụng thuốc trừ ốc bươu vàng

1. Nhóm thuốc trừ ốc thành phần: Me tal de hyde

* Các loại thuốc như: Ta too 6GR, An head 12GR là thuốc trừ ốc bươu vàng có tác dụng tiếp xúc, vị độc thuốc tác động lên hệ thần kinh, làm cho ốc chết.

- Liều lượng: 0.35 kg/sào nên dùng cho những chân ruộng nước trên 5cm không tháo được đi.

- Thời gian: Rắc thuốc trước cấy, lúc cho nước vào ruộng chuẩn bị bón phân.

- Giữ mực nước trong ruộng sau khi rắc 3-5 ngày.

2. Nhóm thuốc trừ ốc thành phần: Ni clo sa mide, Ni clo sa mide và Metaldehyde.

* Các loại thuốc như: MOLLUSKA 700WP, Sieunoi 700WP, Cap gold 750WP, DAICOSA 700WP,...là thuốc trừ ốc có tác dụng xông hơi và vị độc, làm ức chế men hô hấp và trao đổi chất trong cơ thể của ốc. Thuốc có hiệu lực cao diệt ốc bươu vàng và an toàn cho lúa.

Cách sử dụng như sau:

- Liều lượng: Theo hướng dẫn trên vỏ bao bì;

- Thời gian: Trước hoặc ngay sau khi cấy, lúa gieo lúc tháo nước vào ruộng lần đầu tiên (tráng mầm). Phun thuốc khi mực nước trong ruộng xăm xấp (dưới 3cm).

Nơi nhận:

- Chi cục TT&BVTV tỉnh;
 - Thường trực huyện ủy;
 - Thường trực HĐND;
 - Lãnh đạo UBND huyện;
 - Phòng NN&PTNT;
 - Đài phát thanh huyện;
 - UBND các xã, thị trấn;
 - Lưu.TTĐVNN.
- } thay b/c

GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Chanh

